

ARGENTINA

Leishmaniose cutânea e mucosa 2014

Dados demográficos

Menores de 14 anos



25%

Gênero

51% 49%



Renda per capita US\$ 13480/ano

80 72 Expectativa de vida

Cobertura Vegetal 29,4 mi ha

Desmatamento (2005-2010) 3,92%

Ocorrência



139
NOVOS CASOS

19 mucosas

120 cutâneas

95% ≥10 anos

3.5% ≥5 <10 anos

1.5% <5 anos

78.5%



21.5%

86% - Cutânea
14% - Mucosa

Vigilância e Controle

Realiza o controle químico e gestão ambiental do vetor.



19% da população em zonas de transmissão



Ocorrência de surtos: S/ Inf.
Número de focos: S/ Inf.

Notificação obrigatória e individual



Incidência (100.000 hab.)



1.75

Transmissão Índice composto leishmanioses (ICLc)

Baixo



PIB vs População vs Gastos em Saúde



ICLc

- 5.46 - 10.74 (Muito Intenso)
- 0.90 - 5.46 (Intenso)
- 0.06 - 0.90 (Alto)
- 0.67 - 0.06 (Médio)
- 1.12 - -0.67 (Baixo)



Espécies de *Leishmania*

L. amazonensis
L. braziliensis
L. guyanensis



Vetores *Lutzomyia*

L. whitmani
L. neivai
L. migonei



Assistência ao paciente

Tratamento **gratuito** no sistema público de saúde.
Unidades realizando diagnóstico e tratamento: **S/ inf.**
Diagnóstico laboratorial: **21%**
Cura clínica: **S/ inf.**



Medicamentos Disponíveis

Antimoniato de meglumina
Anfotericina B lipossomal



Organização Pan-Americana da Saúde



Organização Mundial da Saúde
ESCRITÓRIO REGIONAL PARA AS Américas

Fontes:
Sisleish - OPAS/OMS - Dados disponibilizados pelos Ministérios de Saúde
Programas Nacionais de Leishmanioses dos países
Banco Mundial
FAO