

# BOLÍVIA

## Leishmaniose cutânea e mucosa 2014

### Dados demográficos

Menores de 14 anos  
35%

Gênero  
50% 50%

Renda per capita  
US\$ 2995/ano

69 65  
Expectativa de vida

Cobertura Vegetal  
57,2 mi ha

Desmatamento (2005-2010)  
2,65%

### Ocorrência

1683  
NOVOS CASOS

228 mucosas

1447 cutâneas

8 desconhecidos

90% ≥10 anos  
5% ≥5 <10 anos  
5% <5 anos

71%

29%

86% - Cutânea  
0,5% - Desconhecidos  
13,5% - Mucosa

### Vigilância e Controle

Realiza o controle químico e gestão ambiental do vetor: S/ Inf.

Ocorrência de surtos: S/ Inf.  
Número de focos: S/ Inf.



49% da população em zonas de transmissão



Notificação obrigatória e individual



Incidência (100.000 hab.)



32,98

Transmissão  
Índice composto leishmaniose (ICLc)

Alta



### PIB vs População vs Gastos em Saúde



ICLc

4.30 - 9.01 (Muito intenso)  
1.76 - 4.30 (Intenso)  
0.25 - 1.76 (Alto)  
-0.84 - 0.25 (Médio)  
-1.67 - -0.84 (Baixo)



Espécies de *Leishmania*

*L. amazonensis*  
*L. braziliensis*  
*L. guyanensis*  
*L. lainsoni*



Vetores *Lutzomyia*

*L. flaviscutellata*  
*L. nuneztovari*  
*L. nuneztovari anglesi*  
*L. carrerae carrerae*  
*L. shawi*, *L. ayrozai*  
*L. yucumensis*  
*L. llanosmartinsi*



Assistência ao paciente

Tratamento gratuito no sistema público de saúde.  
Unidades realizando diagnóstico e tratamento: S/ inf  
Diagnóstico laboratorial: 96,08%  
Cura clínica: 47,89%



Medicamentos Disponíveis

Antimoniato de meglumina  
Anfotericina B lipossomal



Organização Pan-Americana da Saúde



Organização Mundial da Saúde  
ESCRITÓRIO REGIONAL PARA AS Américas

Fontes:  
Sisleish - OPAS/OMS - Dados disponibilizados pelos Ministérios de Saúde  
Programas Nacionais de Leishmanioses dos países  
Banco Mundial  
FAO