

# COLÔMBIA

## Leishmaniose cutânea e mucosa 2014

### Dados demográficos

Menores de 14 anos



27%

Gênero

51% 49%



Renda per capita  
US\$ 7925/ano

78 70  
Expectativa de vida

Cobertura Vegetal

60,5 mi ha

Desmatamento (2005-2010)

0,85%

### Ocorrência



**11586**  
NOVOS CASOS

153 mucosas

11433 cutâneas

90%

≥10 anos

5% ≥5 <10 anos

5% <5 anos

79%



21%

98,7% - Cutânea  
1,3% - Mucosa

### Vigilância e Controle

Realiza o controle químico e gestão ambiental do vetor.



55% da população em zonas de transmissão




Ocorrência de surtos: Sim  
Número de focos: S/ Inf.

Notificação obrigatória e individual




ICLc

13.9 - 27.4 (Muito intenso)  
7.5 - 13.9 (Intenso)  
3.1 - 7.5 (Alto)  
0.2 - 3.1 (Médio)  
-1.2 - 0.2 (Baixo)



### PIB vs População vs Gastos em Saúde



Incidência  
(100.000 hab.)

**43,51**

Transmissão  
Índice composto  
leishmaniose (ICLc)

**Intensa**



Espécies de  
*Leishmania*

*L. amazonensis*  
*L. mexicana*  
*L. braziliensis*  
*L. colombiense*  
*L. guyanensis*  
*L. panamensis*



Vetores  
*Lutzomyia*

*L. flaviscutellata*,  
*L. comlombiana*, *L. spinicrassa*,  
*L. pia*, *L. towsendi*,  
*L. hartmanni*, *L. umbratilis*,  
*L. longiflocosa*, *L. trapidoi*,  
*L. panamensis*, *L. yuilli yuilli*,  
*L. cruciata*



Assistência  
ao paciente

Tratamento **gratuito** no sistema público de saúde.  
Unidades realizando diagnóstico e tratamento:  
**3888** públicas, **14996** privadas e **75** mistas  
Diagnóstico laboratorial:  
**100%**  
Cura clínica: **S/ Inf.**



Medicamentos  
Disponíveis

Antimoniato de meglumina  
Isetionato de pentamidina  
Miltefosine



Organização  
Pan-Americana  
da Saúde



Organização  
Mundial da Saúde  
ESCRITÓRIO REGIONAL PARA AS  
Américas

Fontes:  
Sisleish - OPAS/OMS - Dados disponibilizados pelos Ministérios de Saúde  
Programas Nacionais de Leishmanioses dos países  
Banco Mundial  
FAO