

PANAMÁ

Leishmaniose cutânea e mucosa 2014

Datos demográficos

Menores de
14 anos
28%

Gênero
50% 50%

Renda
per capita
US\$ 11809/ano




81 75
Expectativa
de vida

Cobertura
Vegetal 3,25 mi ha

Desmatamento
(2005-2010) 1,8%



PIB vs População vs Gastos em Saúde



Ocorrência



19 mucosas

1581
NUEVOS CASOS

863 cutâneas

699 desconhecidas


Incidência
(100.000 hab.)

50,53

Transmissão
Índice composto
leishmaniose (ICLc)

Intensa

50% ≥10 anos
15% ≥5 <10 anos
35% <5 anos



44% - Desconhecido
1% - Mucosa
55% - Cutânea

Vigilância e Controle

Realiza o controle químico
e gestão ambiental do vetor.



86% da população em
zonas de transmissão




Ocorrência de surtos: **S/ Inf.**
Número de focos: **S/ Inf.**

Notificação
obrigatória
e individual



ICLc

5.72 - 13.07 (Muito intenso)
0.75 - 5.72 (Intenso)
-0.22 - 0.75 (Alto)
-1.00 - -0.22 (Médio)
-1.36 - -1.00 (Baixo)



Espécies de
Leishmania

L. braziliensis
L. colombiense
L. panamensis



Vetores
Lutzomyia

L. panamensis
L. gomezi
L. trapidoi
L. ylephiletor
L. cruciata
L. sanguinaria



Assistência
ao paciente

Tratamento **gratuito** no
sistema público de saúde.
S/ inf. de unidades
realizando diagnóstico e
tratamento
Diagnóstico laboratorial:
S/ Inf.
Cura clínica: **S/ Inf.**



Medicamentos
Disponíveis

Antimoniato de
Meglumina
Anfotericina B
Desoxicolato



Organização
Pan-Americana
da Saúde



Organização
Mundial da Saúde
ESCRITÓRIO REGIONAL PARA AS
Américas

Fontes:
Sisleish - OPAS/OMS - Dados disponibilizados pelos Ministérios de Saúde
Programas Nacionais de Leishmanioses dos países
Banco Mundial
FAO