

COLOMBIA

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2017

Incidencia
(100.000 hab.) **29,4**

Transmisión
Índice Compuesto de
Leishmaniasis Trienio
(ICLTc 2015-2017) **Intenso**

Ocurrencia

7764

NUEVOS CASOS

7663 cutáneas (98,7%)

101 mucosas (1,3%)

ICLTc trienio* (2015-2017)



*El MSPS reportó 615 casos desde municipios desconocidos que no fueron incluidos en el cálculo del índice compuesto de leishmaniasis.



GRUPO DE EDAD

4,3% < 5 años
6,4% ≥ 5 < 10 años
88,9% > 10 años
0,4% No especificado

10,7% niños
menores de 10 años



SEXO

75% Masculino
25% Femenino

57,3% hombres a
más de 20 años



FRONTERAS

Frontera con **5** países
en **42** municipios

12% de los casos en
las fronteras



VIGILANCIA Y CONTROL

53,5% de la población
en zonas de transmisión

Aumento del % de LC
en menores de 10 años
en comparación a la línea
de base del 2012-2015
(Meta del Plan de Acción).



ESPECIES DE LEISHMANIA

L. amazonensis
L. braziliensis
L. mexicana
L. colombiense
L. guyanensis
L. panamensis



VECTORES LUTZOMYIA

L. flaviscutellata, *L. colombiana*, *L. spinicrassa*, *L. pia*, *L. towsendi*, *L. hartmanni*, *L. umbratilis*, *L. longiflocosa*, *L. trapidoi*, *L. panamensis*, *L. yulli yulli*, *L. cruciata*, *L. columbiana*, *L. gomezi*



ASISTENCIA AL PACIENTE

Diagnóstico de laboratorio:
100%

Cura clínica: **S/I**

% Pacientes curados entre
los tratados: **S/I**



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Antimoniato de Meglumina

Anfotericina B Liposomal

Isetionato de Pentamidina